

## Vorbereitung zum C13-Atemtest

Sofern bei Ihnen ein Atemtest geplant ist, beachten Sie bitte folgende Punkte im Vorfeld:

<b>Wann ist es sinnvoll, diese Untersuchung durchzuführen?</b>	<b>Durchführung des Tests:</b>
<p>Der C13-Atemtest ist geeignet, um den Erfolg einer Helicobacter-Eradikationstherapie zu kontrollieren.</p> <p>Er weist eine hohe Sensitivität auf und ist für den Patienten nicht belastend.</p> <p>Mindestens vier-sechs Wochen nach Antibiotikabehandlung des Helicobacter pylori kann dieser Test durchgeführt werden.</p> <p>Lediglich bei gleichzeitigem Nachweis von Magengeschwüren in der Magenspiegelung (ÖGD) wird häufig eine erneute Endoskopie verlangt.</p>	<p><b>C13-Test:</b> Säureblocker (Protonpumpe Inhibitoren, z.B. Pantoprazol) und Antibiotika müssen vor dem Test mindestens 14 Tage abgesetzt/ pausiert werden.</p> <p>Wir bitten, Sie zudem mindestens vier Stunden vorher nichts mehr zu essen/trinken, keine Medikamente einzunehmen, nicht zu rauchen, kein Kaugummi zu kauen und kein Haftmittel für Zahnprothesen zu benutzen.</p>